



היחידה למחלות זיהומיות בילדים - מרכז רפואי וולפסון

### נגיף הפטיטיס B והחיסון נגדו

#### Hepatitis B - הפטיטיס B (צהבת נגיפית מסוג B)

נגיף הגורם לדלקת של הכבד.  
הדלקת עלולה להיהפך למחלה כרונית, המלווה בשלל סיבוכים גם באיברים אחרים.  
עלולים להתפתח גם אי ספיקת כבד, עד צורך בהשתלה, וסרטן כבד (בסיכון של פי 200 מהאוכלוסייה הכללית!).  
הנגיף מועבר דרך דקירה או חשיפת רקמה מוקוזלית (פה, עין, ועוד) לנוזל גוף מזוהם, ביחסי מין, ומאם לתינוקה.  
גיל ההדבקה משפיע על המעבר לכרוניות – ככל שההדבקה היא בגיל צעיר יותר כך הסיכון למחלה כרונית:  
90% מהילודים שנדבקו יפתחו מחלה כרונית, בגיל הילדות – 20% – 50%, ומבוגרים 5%.



### **חיסון לצהבת נגיפית B - vaccine Hepatitis B**

זהו חיסון מומת, אותו מכינים בשיטה של הנדסה גנטית ממרכיב קטן ממעטפת נגיף הפטיטיס B, המכונה אנטיגן השטח (hepatitis B surface antigen). החיסון אינו יכול לגרום למחלה ולא מכיל מוצרי דם. החיסון ניתן בזריקה לשריר, בשלוש מנות מייד עם הלידה, בגיל חודש ובגיל חצי שנה. 98% – 100% מהילדים יפתחו חיסוניות נגד הנגיף. שאלה הנשאלת רבות לגבי מתן חיסון זה, מדוע יש לחסן כה מוקדם, גם אם אין גורמי סיכון. לשאלה זו מספר תשובות: ראשית, בהדבקה בינקות יש סיכון גבוה מאד (90%) שהמחלה תיהפך לכרונית, עם הסיבוכים הקשורים בכך – אי ספיקת כבד, סרטן כבד. 1 מתוך 4 ילדים שידבקו בינקותם ימותו ממחלות אלו. רב ההדבקה בישראל אינה במעבר ביחסי מין, כפי שנהוג לחשוב, אלא בתוך משפחות. ניתן גם להידבק מנשיכת ילד אחר בגן, ממחט שהושארה בגן המשחקים או על חוף הים על ידי נרקומן, ועוד.

### **תופעות לוואי**

3-9 מתוך 100 ילדים יסבלו מכאב במקום ההזרקה,  
6 מתוך 100 יפתחו חם נמוך.  
2 מתוך 10 יכולים לפתח אי שקט או עייפות.  
תופעות לוואי משמעותיות יותר הן נדירות במיוחד.

**למי אין לתת את החיסון (מעבר לאזהרות הכלליות למתן חיסונים)?**  
במקרה של אלרגיה חמורה לשמרים אין לתת את החיסון להפטיטיס B.